

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が令和5年厚生労働省告示第326号をもって改正され、令和5年12月8日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬33品目、注射薬16品目及び外用薬14品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 品目数 | 7,620 | 3,655 | 2,114 | 26 | 13,415 |

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成13年2月2日保医発第29号）記のⅡの2を次のように改める。また、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成30年6月14日付け保医発0614第1号）の記の3の（4）を削除する。

2 タミフルカプセル75及び後発医薬品のオセルタミビルリン酸塩製剤（カプセル剤及び錠剤）の保険適用上の取扱いについて

- (1) 本製剤については、抗ウイルス薬の投与がA型又はB型インフルエンザウイルス感染症のすべての患者に対しては必須ではないことを踏まえ、患者の状態を十分観察し、本剤の使用の必要性を慎重に検討した上で、A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の発症後の治療を目的として使用した場合に限り算定できるものであること。
- (2) 本製剤の治療に用いる場合の用法及び用量は、「通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、7～10日間経口投与する。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
- (3) 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤はA型又はB型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がない。」とされ、また、用法及び用量に関連する注意において、治療に用いる場合は「インフルエンザ様症状の発現から2日以内に投与を開始すること。症状発現から48時間経過後に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

- (2) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（平成14年4月26日保医発第0426002号）の記のⅡの1を次のように改める。

1 タミフルドライシロップ3%及び後発医薬品のオセルタミビルリン酸塩製剤（ドライシロップ剤）の保険適用上の取扱いについて

- (1) 本製剤については、抗ウイルス薬の投与がA型又はB型インフルエンザウイルス感染症のすべての患者に対しては必須ではないことを踏まえ、患者の状態を十分観察し、本剤の使用の必要性を慎重に検討した上で、A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の発症後の治療を目的として使用した場合に限り算定できるものであること。
- (2) 本製剤の治療に用いる場合の用法及び用量は、次のとおりであり、使用に当たっては十分留意すること。

成人

通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与する。

小児

通常、オセルタミビルとして以下の1回用量を1日2回、5日間、用時懸濁

して経口投与する。ただし、1回最高用量はオセルタミビルとして75 mgとする。

幼児の場合：2 mg/kg（ドライシロップ剤として66.7 mg/kg）

新生児、乳児の場合：3 mg/kg（ドライシロップ剤として100 mg/kg）

- (3) 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤はA型又はB型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がない。」とされ、また、用法及び用量に関連する注意において、治療に用いる場合は「インフルエンザ様症状の発現から2日以内に投与を開始すること。症状発現から48時間経過後に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

- (3) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成23年9月12日付け保医発0912第1号）の記の2の(5)を次のように改める。また、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和4年12月8日付け保医発1208第1号）の記の3の(4)を削除する。

- (5) キュビシン静注用350mg及び後発医薬品のダプトマイシン製剤

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤は肺炎に使用しないこと。本剤は肺サーファクタントに結合し、不活性化される。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

3 関係通知等の一部改正について

- (1) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成22年9月24日付け保医発0924第1号）の記の2の(3)中「ゴナールエフ皮下注ペン300」を「ゴナールエフ皮下注ペン150及び同皮下注ペン300」に改める。

- (2) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和5年3月3日付け保医発0303第2号）を以下のとおり改正する。

- ① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙2に別添2に掲げる医薬品を、別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、令和5年12月8日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和5年12月8日より適用

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------|----------|
| 内用薬 | 1169015F2030 | ゾニサミド | 25mg1錠 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 住友ファーマプロモ | 353.20 |
| 内用薬 | 1169015F3037 | ゾニサミド | 50mg1錠 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」 | 住友ファーマプロモ | 529.80 |
| 内用薬 | 2129011F1043 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 50mg1錠 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | トーアエイヨー | 22.30 |
| 内用薬 | 2129011F2040 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 100mg1錠 | ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」 | トーアエイヨー | 42.50 |
| 内用薬 | 2190031F1058 | アンプリセンタン | 2.5mg1錠 | アンプリセンタン錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 1,483.30 |
| 内用薬 | 2590007F2362 | プロピペリン塩酸塩 | 20mg1錠 | 局 プロピペリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 29 |
| 内用薬 | 3929007F1045 | 酢酸亜鉛水和物 | 25mg1錠 | 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」 | ダイト | 100.60 |
| 内用薬 | 3929007F2041 | 酢酸亜鉛水和物 | 50mg1錠 | 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 | ダイト | 157.60 |
| 内用薬 | 3999033F1042 | レボカルニチン | 100mg1錠 | レボカルニチンFF錠100mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 39.50 |
| 内用薬 | 3999033F2049 | レボカルニチン | 250mg1錠 | レボカルニチンFF錠250mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 100.10 |
| 内用薬 | 3999033S1032 | レボカルニチン | 10%1mL | レボカルニチンFF内用液10%「アメル」 | 共和薬品工業 | 30.30 |
| 内用薬 | 3999033S1040 | レボカルニチン | 10%1mL | レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」 | 東和薬品 | 30.30 |
| 内用薬 | 3999033S2039 | レボカルニチン | 10%5mL1包 | レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」 | 共和薬品工業 | 137.30 |
| 内用薬 | 3999033S2047 | レボカルニチン | 10%5mL1包 | レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「トーワ」 | 東和薬品 | 137.30 |
| 内用薬 | 3999033S3035 | レボカルニチン | 10%10mL1包 | レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「アメル」 | 共和薬品工業 | 263.30 |
| 内用薬 | 3999033S3043 | レボカルニチン | 10%10mL1包 | レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」 | 東和薬品 | 263.30 |
| 内用薬 | 4291020F1078 | ダサチニブ水和物 | 20mg1錠 | ダサチニブ錠20mg「BMSH」 | ブリistol・マイヤーズスクイブ販売 | 1,273.40 |
| 内用薬 | 4291020F2074 | ダサチニブ水和物 | 50mg1錠 | ダサチニブ錠50mg「BMSH」 | ブリistol・マイヤーズスクイブ販売 | 3,034.40 |
| 内用薬 | 4291024M1032 | レナリドミド水和物 | 5mg1カプセル | レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 | ブリistol・マイヤーズスクイブ販売 | 4,035.40 |
| 内用薬 | 4291024M1040 | レナリドミド | 5mg1カプセル | レナリドミドカプセル5mg「F」 | 富士製薬工業 | 4,035.40 |
| 内用薬 | 4291024M1059 | レナリドミド | 5mg1カプセル | レナリドミドカプセル5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4,035.40 |
| 内用薬 | 4291024M2039 | レナリドミド水和物 | 2.5mg1カプセル | レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」 | ブリistol・マイヤーズスクイブ販売 | 3,385.90 |
| 内用薬 | 4291024M2047 | レナリドミド | 2.5mg1カプセル | レナリドミドカプセル2.5mg「F」 | 富士製薬工業 | 3,385.90 |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|
| 内用薬 | 4291024M2055 | レナリドミド | 2.5mg 1カプセル | レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3,385.90 |
| 内用薬 | 6250021F1028 | オセルタミビルリン酸塩 | 75mg 1錠 | オセルタミビル錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 114.40 |
| 注射薬 | 1214406G1030 | メピバカイン塩酸塩 | 0.5% 10mL 1筒 | メピバカイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ50mg/10mL「NP」 | ニプロ | 186 |
| 注射薬 | 1214406G2037 | メピバカイン塩酸塩 | 1% 10mL 1筒 | メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」 | ニプロ | 158 |
| 注射薬 | 1214406G3033 | メピバカイン塩酸塩 | 2% 10mL 1筒 | メピバカイン塩酸塩注射液2%シリンジ200mg/10mL「NP」 | ニプロ | 228 |
| 注射薬 | 2123404D1041 | ランジオロール塩酸塩 | 50mg 1瓶 | ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」 | 富士製薬工業 | 1,960.00 |
| 注射薬 | 2123404D3036 | ランジオロール塩酸塩 | 150mg 1瓶 | ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」 | 富士製薬工業 | 5,261.00 |
| 注射薬 | 6119402D1048 | ダブトマイシン | 350mg 1瓶 | ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」 | ニプロ | 4,993.00 |
| 外用薬 | 1319758Q1030 | ジクアホソルNa点眼液 | 3% 5mL 1瓶 | ジクアホソルNa点眼液3%「ニットー」 | 東亜薬品 | 187.00 |
| 外用薬 | 8219700S5085 | フェンタニル | 2.1mg 1枚 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 1,105 |
| 外用薬 | 8219700S6081 | フェンタニル | 4.2mg 1枚 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 2,134 |
| 外用薬 | 8219700S7088 | フェンタニル | 8.4mg 1枚 | フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 3,694 |
| 外用薬 | 8219700S8084 | フェンタニル | 12.6mg 1枚 | フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 5,689 |
| 外用薬 | 8219700S9080 | フェンタニル | 16.8mg 1枚 | フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 7,409 |
| 外用薬 | 8219700T1042 | フェンタニル | 0.84mg 1枚 | フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 257 |
| 外用薬 | 8219700T2049 | フェンタニル | 1.7mg 1枚 | フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 476 |
| 外用薬 | 8219700T3045 | フェンタニル | 3.4mg 1枚 | フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 890 |
| 外用薬 | 8219700T4041 | フェンタニル | 5mg 1枚 | フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 1,298 |
| 外用薬 | 8219700T5048 | フェンタニル | 6.7mg 1枚 | フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 1,637 |

別紙2 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)
※令和5年12月8日より適用

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|---------|--------|--------------------|----------|-------|
| 内用薬 | 3943001F2396 | アロプリノール | 50mg1錠 | 局 アロプリノール錠50mg「NS」 | 日新製薬(山形) | 10.10 |

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
 ※令和5年12月8日より適用

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|-------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 内用薬 | 1169015F2022 | ゾニサミド | 25mg1錠 | トレリーフOD錠25mg | 住友ファーマ | 966.10 |
| 内用薬 | 1169015F3029 | ゾニサミド | 50mg1錠 | トレリーフOD錠50mg | 住友ファーマ | 1,449.10 |
| 内用薬 | 2129011F1035 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 50mg1錠 | ベプリコール錠50mg | オルガノン | 44.50 |
| 内用薬 | 2129011F2031 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 100mg1錠 | ベプリコール錠100mg | オルガノン | 84.80 |
| 内用薬 | 3999033S1024 | レボカルニチン | 10%1mL | エルカルチンFF内用液10% | 大塚製薬 | 56.70 |
| 内用薬 | 3999033S2020 | レボカルニチン | 10%5mL1包 | エルカルチンFF内用液10%分包5mL | 大塚製薬 | 293.40 |
| 内用薬 | 3999033S3027 | レボカルニチン | 10%10mL1包 | エルカルチンFF内用液10%分包10mL | 大塚製薬 | 562.60 |
| 内用薬 | 4291024M1024 | レナリドミド水和物 | 5mg1カプセル | レブラミドカプセル5mg | ブリistol・マイヤーズ スクイブ | 8,085.30 |
| 内用薬 | 4291024M2020 | レナリドミド水和物 | 2.5mg1カプセル | レブラミドカプセル2.5mg | ブリistol・マイヤーズ スクイブ | 6,783.90 |
| 注射薬 | 2123404D1033 | ランジオロール塩酸塩 | 50mg1瓶 | オノアクト点滴静注用50mg | 小野薬品工業 | 3,920.00 |
| 注射薬 | 2123404D3028 | ランジオロール塩酸塩 | 150mg1瓶 | オノアクト点滴静注用150mg | 小野薬品工業 | 10,522.00 |
| 外用薬 | 1319758Q1021 | ジクアホソルナトリウム | 3%5mL1瓶 | ジクアス点眼液3% | 参天製薬 | 529.70 |
| 外用薬 | 1319758Q2028 | ジクアホソルナトリウム | 3%5mL1瓶 | ジクアスLX点眼液3% | 参天製薬 | 1,060.00 |

薬価基準告示

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 |
|----|---|--------------------|------------------|----------|
| 1 | 内用薬 局 アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末 | アトロピン硫酸塩水和物 | 1 g | 2,452.20 |
| 2 | 内用薬 局 アロプリノール錠50mg「NS」 | アロプリノール | 50mg 1錠 | 10.10 |
| 3 | 内用薬 アンプリセンタン錠2.5mg「JG」 | アンプリセンタン | 2.5mg 1錠 | 1,483.30 |
| 4 | 内用薬 オセルタミビル錠75mg「トーワ」 | オセルタミビルリン酸塩 | 75mg 1錠 | 114.40 |
| 5 | 内用薬 局 クエン酸水和物「コザカイ」原末 | クエン酸水和物 | 10 g | 14.20 |
| 6 | 内用薬 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」 | 酢酸亜鉛水和物 | 25mg 1錠 | 100.60 |
| 7 | 内用薬 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 | 酢酸亜鉛水和物 | 50mg 1錠 | 157.60 |
| 8 | 内用薬 局 セフジトレン ビボキシル小児用細粒10%「OK」 | セフジトレン ビボキシル | 100mg 1 g | 166.30 |
| 9 | 内用薬 局 セフジトレン ビボキシル錠100mg「OK」 | セフジトレン ビボキシル | 100mg 1錠 | 48.30 |
| 10 | 内用薬 ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | ゾニサミド | 25mg 1錠 | 353.20 |
| 11 | 内用薬 ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」 | ゾニサミド | 50mg 1錠 | 529.80 |
| 12 | 内用薬 ダサチニブ錠20mg「BMSH」 | ダサチニブ水和物 | 20mg 1錠 | 1,273.40 |
| 13 | 内用薬 ダサチニブ錠50mg「BMSH」 | ダサチニブ水和物 | 50mg 1錠 | 3,034.40 |
| 14 | 内用薬 局 乳糖水和物「ホエイ」 | 乳糖水和物 | 10 g | 17.00 |
| 15 | 内用薬 局 プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | プロピベリン塩酸塩 | 20mg 1錠 | 29.10 |
| 16 | 内用薬 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 50mg 1錠 | 22.30 |
| 17 | 内用薬 ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 100mg 1錠 | 42.50 |
| 18 | 内用薬 ポリミキシンB硫酸塩錠25万単位「ファイザー」 | ポリミキシンB硫酸塩 | 25万単位 1錠 | 80.00 |
| 19 | 内用薬 ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」 | ポリミキシンB硫酸塩 | 100万単位 1錠 | 241.80 |
| 20 | 内用薬 レナリドミドカプセル2.5mg「F」 | レナリドミド水和物 | 2.5mg 1カプセル | 3,385.90 |
| 21 | 内用薬 レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」 | レナリドミド水和物 | 2.5mg 1カプセル | 3,385.90 |
| 22 | 内用薬 レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」 | レナリドミド水和物 | 2.5mg 1カプセル | 3,385.90 |
| 23 | 内用薬 レナリドミドカプセル5mg「F」 | レナリドミド水和物 | 5mg 1カプセル | 4,035.40 |
| 24 | 内用薬 レナリドミドカプセル5mg「サワイ」 | レナリドミド水和物 | 5mg 1カプセル | 4,035.40 |
| 25 | 内用薬 レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 | レナリドミド水和物 | 5mg 1カプセル | 4,035.40 |
| 26 | 内用薬 レボカルニチンFF錠100mg「アメル」 | レボカルニチン | 100mg 1錠 | 39.50 |
| 27 | 内用薬 レボカルニチンFF錠250mg「アメル」 | レボカルニチン | 250mg 1錠 | 100.10 |
| 28 | 内用薬 レボカルニチンFF内用液10%「アメル」 | レボカルニチン | 10% 1mL | 30.30 |
| 29 | 内用薬 レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」 | レボカルニチン | 10% 1mL | 30.30 |
| 30 | 内用薬 レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「アメル」 | レボカルニチン | 10% 5mL 1包 | 137.30 |
| 31 | 内用薬 レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「トーワ」 | レボカルニチン | 10% 5mL 1包 | 137.30 |
| 32 | 内用薬 レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「アメル」 | レボカルニチン | 10% 10mL 1包 | 263.30 |
| 33 | 内用薬 レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」 | レボカルニチン | 10% 10mL 1包 | 263.30 |
| 34 | 注射薬 アーピタックス注射液500mg | セツキシマブ（遺伝子組換え） | 500mg100mL 1瓶 | 166,678 |
| 35 | 注射薬 カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 | カナマイシン硫酸塩 | 1 g 1管 | 320 |
| 36 | 注射薬 ゴナールエフ皮下注ベン150 | ホリトロピンアルファ（遺伝子組換え） | 150国際単位0.25mL 1筒 | 6,558 |
| 37 | 注射薬 局 ストレプトマイシン硫酸塩注射液1g「明治」 | ストレプトマイシン硫酸塩 | 1 g 1瓶 | 396 |
| 38 | 注射薬 ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」 | ダブトマイシン | 350mg 1瓶 | 4,993 |
| 39 | 注射薬 局 メビパカイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ50mg/10mL「NP」 | メビパカイン塩酸塩 | 0.5%10mL 1筒 | 186 |
| 40 | 注射薬 局 メビパカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」 | メビパカイン塩酸塩 | 1%10mL 1筒 | 158 |
| 41 | 注射薬 局 メビパカイン塩酸塩注射液2%シリンジ200mg/10mL「NP」 | メビパカイン塩酸塩 | 2%10mL 1筒 | 228 |
| 42 | 注射薬 局 メビパカイン塩酸塩注0.5%「日新」 | メビパカイン塩酸塩 | 0.5% 5mL 1管 | 79 |
| 43 | 注射薬 局 メビパカイン塩酸塩注0.5%「日新」 | メビパカイン塩酸塩 | 0.5%10mL 1管 | 86 |
| 44 | 注射薬 局 メビパカイン塩酸塩注1%「日新」 | メビパカイン塩酸塩 | 1% 5mL 1管 | 79 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 45 | 注射薬 局 メピバカイン塩酸塩注1%「日新」 | メピバカイン塩酸塩 | 1%10mL 1管 | 86 |
| 46 | 注射薬 局 メピバカイン塩酸塩注2%「日新」 | メピバカイン塩酸塩 | 2% 5mL 1管 | 84 |
| 47 | 注射薬 局 メピバカイン塩酸塩注2%「日新」 | メピバカイン塩酸塩 | 2%10mL 1管 | 98 |
| 48 | 注射薬 ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」 | ランジオロール塩酸塩 | 50mg 1瓶 | 1,960 |
| 49 | 注射薬 ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」 | ランジオロール塩酸塩 | 150mg 1瓶 | 5,261 |
| 50 | 外用薬 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液0.5%「東海」 | クロルヘキシジングルコン酸塩液 | 0.5%10mL | 7 |
| 51 | 外用薬 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「東海」 | クロルヘキシジングルコン酸塩液 | 5%10mL | 21 |
| 52 | 外用薬 ジクアホソルNa点眼液3%「ニットー」 | ジクアホソルナトリウム | 3% 5mL 1瓶 | 187 |
| 53 | 外用薬 麻 フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」 | フェンタニル | 0.84mg 1枚 | 257 |
| 54 | 外用薬 麻 フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」 | フェンタニル | 1.7mg 1枚 | 476 |
| 55 | 外用薬 麻 フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」 | フェンタニル | 3.4mg 1枚 | 890 |
| 56 | 外用薬 麻 フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」 | フェンタニル | 5mg 1枚 | 1,298 |
| 57 | 外用薬 麻 フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」 | フェンタニル | 6.7mg 1枚 | 1,637 |
| 58 | 外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」 | フェンタニル | 2.1mg 1枚 | 1,105 |
| 59 | 外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」 | フェンタニル | 4.2mg 1枚 | 2,134 |
| 60 | 外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」 | フェンタニル | 8.4mg 1枚 | 3,694 |
| 61 | 外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」 | フェンタニル | 12.6mg 1枚 | 5,689 |
| 62 | 外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」 | フェンタニル | 16.8mg 1枚 | 7,409 |
| 63 | 外用薬 局 ベンザルコニウム塩化物消毒液50%「ヤクハン」 | 濃ベンザルコニウム塩化物 | 10mL | 14.20 |

(参考2：新旧対照表)

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成13年2月2日保医発第29号）の記のⅡの2

(傍線部分は改正部分)

| 改正後 | 改正前 |
|--|---|
| <p>2 タミフルカプセル 75 <u>及び後発医薬品のオセルタミビルリン酸塩製剤（カプセル剤及び錠剤）</u>の保険適用上の取扱いについて</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 本製剤の治療に用いる場合の<u>用法及び用量は</u>、「通常、成人及び体重 37.5 kg以上の小児にはオセルタミビルとして1回 75 mgを1日2回、5日間経口投与する。」と<u>されているので</u>、使用に当たっては十分留意すること。</p> <p>(3) 本製剤の<u>効能又は効果に関連する注意</u>において、「<u>本剤はA型又はB型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がない。</u>」とされ、また、<u>用法及び用量に関連する注意</u>において、<u>治療に用いる場合は「インフルエンザ様症状の発現から2日以内に投与を開始すること。症状発現から48時間経過後に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない。」</u>とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</p> | <p>2 タミフルカプセル 75 の保険適用上の取扱いについて</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 本製剤の治療に用いる場合の<u>用法・用量は</u>「通常、成人及び体重 37.5 kg以上の小児にはオセルタミビルとして1回 75 mgを1日2回、5日間経口投与する。」と<u>されており</u>、使用に当たっては十分留意すること。</p> <p>(3) 本製剤の<u>使用上の注意</u>に、「<u>A型又はB型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がない。</u>」旨及び「<u>治療に用いる場合には、インフルエンザ様症状の発現から2日以内に投与を開始すること（症状発現から48時間経過後に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない）。</u>」旨が記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。</p> |

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 30 年 6 月 14 日付け保医発 0614 第 1 号）の記の 3 の（4）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後 | 改正前 |
|---|--|
| <p>3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について <u>（削除）</u></p> | <p>3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について <u>（4）オセルタミビル DS3%「サワイ」及び同カプセル 75mg「サワイ」</u></p> <p><u>① 本製剤については、抗ウイルス薬の投与が A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症のすべての患者に対しては必須ではないことを踏まえ、患者の状態を十分観察し、本剤の使用の必要性を慎重に検討した上で、A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症の発症後の治療を目的として使用した場合に限り算定できるものであること。</u></p> <p><u>② 本製剤の治療に用いる場合の用法・用量は、次のとおりであり、使用に当たっては十分留意すること。</u></p> <p><u>ア オセルタミビル DS3%「サワイ」</u></p> <p><u>成人</u> <u>通常、オセルタミビルとして 1 回 75 mg を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して経口投与する。</u></p> <p><u>小児</u> <u>通常、オセルタミビルとして以下の 1 回用量を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1 回最高用量はオセルタミビルとして 75mg とする。</u></p> <p><u>幼小児の場合：2 mg/kg（ドライシロップ剤として 66.7mg/kg）</u></p> <p><u>新生児、乳児の場合：3 mg/kg（ドライシロップ剤として 100mg/kg）</u></p> <p><u>イ オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」</u></p> |

通常、成人及び体重 37.5kg 以上の小児にはオセルタミビルとして 1 回 75mg を 1 日 2 回、5 日間経口投与する。

- ③ 本製剤の使用上の注意に、「A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がない。」旨及び「治療に用いる場合には、インフルエンザ様症状の発現から 2 日以内に投与を開始すること（症状発現から 48 時間経過後に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない）。」旨が記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（平成 14 年 4 月 26 日保医発第 0426002 号）の記のⅡの 1

（傍線部分は改正部分）

| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| <p>1 タミフルドライシロップ 3%及び後発医薬品のオセルタミビルリン酸塩製剤（ドライシロップ剤）の保険適用上の取扱いについて</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 本製剤の治療に用いる場合の<u>用法及び用量</u>は、次のとおりであり、使用に当たっては十分留意すること。</p> <p>成人 通常、オセルタミビルとして 1 回 75 mg を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して経口投与する。</p> <p>小児 通常、オセルタミビルとして以下の 1 回用量を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1 回最高用量はオセルタミビルとして 75 mg とする。</p> <p>幼小児の場合：2 mg/kg（ドライシロップ剤として 66.7 mg/kg） 新生児、乳児の場合：3 mg/kg（ドライシロップ剤として 100 mg/kg）</p> <p>(3) 本製剤の<u>効能又は効果に関連する注意</u>において、「<u>本剤は A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がない。</u>」とされ、また、<u>用法及び用量に関連する注意</u>において、<u>治療に用いる場合は「インフルエンザ様症状の発現から 2 日以内に投与を開始すること。症状発現から 48 時間経過後に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</u></p> | <p>1 タミフルドライシロップ 3%の保険適用上の取扱いについて</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 本製剤の治療に用いる場合の<u>用法・用量</u>は、次のとおりであり、使用に当たっては十分留意すること。</p> <p>成人 通常、オセルタミビルとして 1 回 75 mg を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して経口投与する。</p> <p>小児 通常、オセルタミビルとして以下の 1 回用量を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1 回最高用量はオセルタミビルとして 75 mg とする。</p> <p>幼小児の場合：2 mg/kg（ドライシロップ剤として 66.7 mg/kg） 新生児、乳児の場合：3 mg/kg（ドライシロップ剤として 100 mg/kg）</p> <p>(3) 本製剤の<u>使用上の注意</u>に、「<u>A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がない。</u>」旨及び「<u>治療に用いる場合には、インフルエンザ様症状の発現から 2 日以内に投与を開始すること（症状発現から 48 時間経過後に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない。）</u>」旨が記載されているので、<u>使用に当たっては十分留意すること。</u></p> |

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 23 年 9 月 12 日付け保医発 0912 第 1 号）の記の 2 の（5）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(5) <u>キュビシン静注用 350mg 及び後発医薬品のダプトマイシン製剤</u> 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「<u>本剤は肺炎に使用しないこと。本剤は肺サーファクタントに結合し、不活性化される。</u>」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</p> | <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(5) キュビシン静注用 350mg 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に「<u>本剤は肺炎に使用しないこと。[本剤は肺サーファクタントに結合し、不活性化される。]</u>」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。</p> |

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成4年12月8日付け保医発1208第1号）の記の3の(4)

(傍線部分は改正部分)

| 改正後 | 改正前 |
|---------------------------------------|---|
| 3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について <u>(削除)</u> | 3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について <u>(4) ダプトマイシン静注用 350mg「サワイ」</u> <u>本剤の効能又は効果に関連する注意に「本剤は肺炎に使用しないこと。本剤は肺サーファクタントに結合し、不活性化される。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。</u> |

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 22 年 9 月 24 日付け保医発 0924 第 1 号）の記の 2 の（3）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後 | 改正前 |
|--|---|
| 2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について (3) ゴナールエフ皮下注ペン <u>150 及び同皮下注ペン 300</u> (略) | 2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について (3) ゴナールエフ皮下注ペン <u>300</u> (略) |